

JEFFERSON PARISH PUBLIC SCHOOL SYSTEM PEDICULOSIS REFERRAL FORM

TY HỌC CHÁNH QUẬN JEFFERSON MẪU THAM KHẢO TRỊ CHÍ RẬN

HỌC SINH: _____ NGÀY: _____

Kính thưa Phụ huynh/Người Giám hộ:

Con của quý vị vừa bị phát giác đầu của em có chấy. Đây là một sự lây truyền chấy từ một người sang một người khác trong thời gian ngắn. Để ngăn ngừa chấy có thể lây ra cho cả trường học, tình trạng trị chấy phải được áp dụng tức khắc. Quý vị có thể tham khảo với bác sĩ hoặc làm theo những đề nghị dưới đây. **(ĐỂ CHO CON CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC NHẬN ĐI HỌC TRỞ LẠI, QUÝ PHỤ HUYNH PHẢI HOÀN TẤT, KÝ TÊN, VÀ ĐỀ NGÀY TRONG THƯ CỦA PHỤ HUYNH ĐÍNH KÈM, GIAO HOÀN NHỮNG VẤN KIỆN ĐÃ KÝ TÊN CHO TRƯỜNG HỌC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI)**

1. TIN TỨC QUAN TRỌNG

- Có rất nhiều thuốc trị chấy bày bán tại các quầy của tiệm thuốc. Quý vị có thể gọi bác sĩ đề cho toa.
- Kiểm soát tất cả mọi người trong nhà để xem có chấy hoặc trứng chấy. Chỉ trị những người đầu có chấy.
- Đầu tiên gọi cho bác sĩ nếu quý phụ huynh đang có thai, đang được điều trị, bị dị ứng, hoặc suyễn, kinh phong hoặc có trứng trong lông mày hoặc lông mi. Thuốc chấy không được dùng cho trẻ em dưới ba tuổi.

2. PHƯƠNG PHÁP TRỊ CHÍ

- Theo sự chỉ dẫn trên nắp hộp, thật cẩn thận khi dùng thuốc trên bồn rửa mặt (không được dùng trong bồn tắm). Che mắt bằng giẻ lau.
- Tước bỏ trứng bằng móng tay, lược dày, nhíp hoặc nhỏ sợi tóc có dính trứng chấy.
- Phải trị liên tục từ 7 đến 10 ngày để giết chấy mới nở.

3. TRỊ CHÍ Ở NHÀ

- Giặt tất cả quần áo, khăn lau, khăn trải giường của người có chấy bằng nước nóng và xấy thật nóng. Lược và bàn chải phải lược bằng nước nóng từ 5 đến 10 phút hoặc ngâm trong loại xà bông sát trùng trong 30 phút.
- Tẩy khô tất cả quần áo hoặc nón không thể giặt được.
- Hút bụi là đường lối an toàn và tốt nhất để kiểm soát chấy trong nệm, thảm, bàn ghế và thú nhồi bông.
- Đặt những vật dụng không thể giặt được hoặc những vật khó giặt hoặc hút bụi trong một túi nylon thật kín trong vòng 2 tuần.
- Tiếp tục kiểm soát mọi người trong nhà mỗi ngày trong 2 hoặc 3 tuần lễ.

GHI CHÚ: - Ai cũng có thể lây chấy từ người khác hoặc bằng dùng chung những vật tiếp xúc với đầu, cổ hoặc vai (thí dụ: lược, bàn chải, nón, áo khoác, khăn...) Kiểm soát đều đặn là phương pháp tốt nhất ngăn ngừa đặc biệt cho trẻ con thường than phiền ngứa da đầu hoặc thường xuyên gãi đầu.

Kính thư,

Hiệu trưởng/ Chỉ định viên